

SolfoMet®

GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER

A SolfoMet gombaölő permetezőszert azonos a 04.2/7016-1/2015. NÉBIH számon engedélyezett **Microthiol Special** gombaölő permetezőszerral.

A növényvédő szert gyártja és az engedély tulajdonosa:

UPL EUROPE LTD.,

The Centre Birchwood Park, Warrington,
Cheshire WA3 6YN, Egyesült Királyság
tel.: +44 1925 819999



Címkézésért felelős személy:

Dr. Imrei Zoltán, 1124 Budapest, Fodor u. 33.

Első magyarországi forgalmazó:

AGROMETRY KFT.

2000 Szentendre, Kisforrás u. 30.

Tel.: +36 20 910-9503, +36 20 365-6915

E-mail: info@agrometry.hu

Szerforma: vízben diszpergálható granulátum (WG)

Hatóanyag: 800 g/kg (80 m/m %) kén

Forgalomba hozatali engedély száma: 04.2/630-1/2018 NÉBIH

Forgalmazási kategória: III.

Gyártási idő (nap, hó, év) és gyártási szám: A csomagolóburkolaton található.

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **3 év.**



5 999887 980145

AZ EMBERI EGÉSZSÉG ÉS A KÖRNYEZET VESZÉLYEZTETÉSÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN BE KELL TARTANI A HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELŐÍRÁSAIT. FELHASZNÁLÁS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY MEGÉRTETTE!

EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉG, A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI
A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon): >5000 mg/ttkg
Vízí szerveszetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P270 A termék használatakor tilos enni, inni vagy dohányozni.

P280 Védőkesztyű használata kötelező.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)

SPe 3 A vízszervezetek érdekében a felszíni vizektől **5 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyp) biztonsági övezetet!

A nem cél izellábiak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől szőlő kultúrában **5 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása mellett a biztonsági övezet megtartása nem szükséges. **Almatermésű és csonthéjas** kultúrákban **15 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén **10 m**, 75%-os szórófej esetén **5 m** védőtávolság szükséges.

EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ÖVÉRENDSZABÁLYOK

Egyéni védőfelszerelés

Előkészítőknak: védőkesztyű

Kijuttatóknak: védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Mérgezőkor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás: Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti, megfigyelő kezelés

Ellenanyag: speciális antidótuma nincs

VÁRAKOZÁSI IDŐK:

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Elemezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:

A készítmény 25 °C felett - az esetleges perzselések elkerülése érdekében - nem alkalmazható!

Kalászosokban (őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, zab, tritikáé), **kölesben és pohánkában** a fertőzés mértékétől függően egy - három alkalommal szükséges védekezni. A permetezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor – bokrosodás végén, szárbaindulás elején - kell megkezdeni és szükség esetén megismételni a kalászhányás-virágzás idején.

Szőlőben (bor-, csemege-) lisztharmat ellen a kezeléseket előrejelzésre alapozva preventíven kell elkezdeni, majd a fertőzés alakulása szerint 7-10 naponként szükség szerint megismételni. Melegebb, szárazabb időjárásnál alacsonyabb dózis, súlyos fertőzésveszély esetén a magasabb dózis és a rövidebb (7 napos) permetezési forduló alkalmazása ajánlott. A szőlő intenzív fejlődési szakaszában a készítmény felhasználható a felszívódó szerek kontakt kiegészítőjeként.

Almatermésűekben (alma, körte, birs, naspolya) a permetezést egérfül állapotban kell megkezdeni és 7-14 naponként, a fertőzési nyomástól függően célszerű megismételni.

Csonthéjasokban (cseresznye, meggy, szilva, őszibarack, kajsz) a permetezést az első levelek kiemelkedésétől megkezdhető és 7-10 naponként, a fertőzési nyomástól függően célszerű megismételni.

Bogyósokban (köszméte, piros- és feketeribizske, szamóca, málna, szeder, bodza, áfonya, csipkebogyó) rügyattanást követően virágzás előtt, a lisztharmat primer tünetjeinek blokkolására 1-2 alkalommal kell védekezni, a magasabb dózis felhasználásával. A tenyészidőszak további részében a fertőzés erősségétől függően válasszuk meg a dózist.

Cukorrépában lisztharmat ellen a kezelést a fertőzés megjelenésekor célszerű végrehajtani, amely fertőzésveszély fenállása esetén háromszor megismételhető.

Lencse, csicszeriborsó, és lóbab kultúrákban a permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell megkezdeni, majd szükség esetén 10-14 nap múlva megismételni.

Az engedélyezett **zöldsfélékben, gyógy- és fűszernövényekben**, továbbá **mogyoróban, földimogyoróban, kenderben, olajretekben, valamint közterületi díszfák és díszcserjékben** a kezelést a fertőzés megjelenésekor célszerű végrehajtani, és annak mértékétől függően többször megismételhető. A szer alkalmazásakor figyelemmel kell lenni egyes növényfajták kénérzékenységére.

A készítményt közterületen csak felsőfokú növényvédelmi képzéssel és hatályos engedéllyel rendelkező személy irányítása mellett lehet kijuttatni. A közterületeken történő felhasználáskor a kezeléssel az érintett lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell, és fel kell hívni a figyelmet a kezeléssel járó közegészségügyi előírások betartására. Frissen kezelt, permetezett területen tartózkodni tilos!
Az engedélyezett szőlő, almatermésű, csonthéjas és kabakos kultúrákban a készítmény atkák gyérítésére is alkalmas.
A kén több hatáshelyű (FRAC kód: M 2) kontakt gombaölő szer hatóanyag.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

GYÁRTÓI AJÁNLÁS

A hatás feltételei: A termék kontakt készítmény, ezért a növényzet megfelelő permetlé-borítottsága fontos!

Keverésre vonatkozó ajánlások: Más készítménnyel történő keverés előtt keverési próbát kell végezni.

Keverhető rézzel és rovarölő szerekkel!

A munka végeztével az eszközöket gondosan tisztítsa meg. A gyártó felelőssége a helytelen tárolásból és felhasználásból eredő károkról nem terjed ki.

Az engedélyokiratban előírt dózisokat pontosan be kell tartani. A permetlé készítése céljából a kívánt mennyiségű szert kb. azonos mennyiségű vízzel gondosan sima péppé kell keverni, ezután cca. 30 percig állni hagyjuk, csak ezután szabad az előírt térfogatra felhígítani.

A permetezést megelőzően, közben és utána 24 órán belül tilos az alkoholfogyasztás!

Mérgezőkor vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.



CSEBER NONPROFIT KFT.
A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a <http://www.cseber.hu> címen.
Tel.: +36 (1) 340-4888

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

| Kultúra | Károsító | A kezelések maximális száma | Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap) | A kijuttatáshoz szükséges szer (kg/ha) | A kijuttatáshoz szükséges víz (l/ha) | A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint) |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| kalászosok (őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, zab, tritikáé) | lisztharmat | 3 | 7 | 5,0-7,5 | 200-400 | 5 mellékajtásos állapottól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) |
| | köles, pohánka | lisztharmat | 10 | 7 | 3,0-8,0 | 300-1000 |
| szőlő (bor-, csemege-) | lisztharmat | 14 | 7 | 5,0-8,0 | 500-1500 | egérfüles állapottól (BBCH 10) 1 héttel betakarítás előtti állapottig (BBCH 86) |
| almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) | lisztharmat, levéllikasztó gombák | 14 | 7 | 5,0-7,5 | 500-1500 | első levelek kiemelkedésétől (BBCH 10) 1 héttel betakarítás előtti állapottig (BBCH 86) |
| csonthéjasok (cseresznye, meggy, szilva, őszibarack, kajsz) | lisztharmat | 6 | 7 | 5,0-7,5 | 200-1000 | 3 leveles állapottól (BBCH 13) 50%-os érésig (BBCH 85) |
| kabakosok (uborka, sütőtök, spárgatök, cukkini, patisszon) | lisztharmat | 6 | 14 | 3,0-7,0 | 600-1200 | virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 1 héttel betakarítás előtti állapottig (BBCH 86) |
| köszméte, ribizske (piros-, fekete-), szamóca, málna, szeder, bodza, áfonya, csipkebogyó | lisztharmat | 4 | 7 | 5,0-7,5 | 300-600 | szorzódás végétől (BBCH 39) gyökérfejlődés végéig (BBCH 49) |
| cukorrépa | lisztharmat | 4 | 7 | 5,0-8,0 | 400-600 | 5 leveles állapottól (BBCH 15) virágzás végéig (BBCH 69) |
| tojásgyümölcs | lisztharmat | 6 | 7 | 5,0 | 500-1000 | levélrügy duzzadás végétől (BBCH 03) virágrügy duzzadásig (BBCH 51) |
| mogyoró | lisztharmat | 6 | 7 | 5,0-7,5 | 200-600 | szorzódás kezdetétől (BBCH 31) végső hüvelyméret eléréséig (BBCH 79) |
| földi mogyoró | lisztharmat | 6 | 7 | 5,0 | 500-1000 | 1. látható szárköz megjelenésétől (BBCH 31) teljes becoméret eléréséig (BBCH 79) |
| olajretek | lisztharmat | 9 | 7 | 5,0 | 300-800 | 9. pár oldalhajtás megjelenésétől (BBCH 29) makkocskaszerű fejlődés végéig (BBCH 79) |
| kender | lisztharmat | 4 | 10 | 5,0 | 200-500 | 6. levél megjelenésétől (BBCH 16) dőlés kezdetéig (BBCH 47) |
| lencse, csicszeriborsó, lóbab | lisztharmat | 4 | 10 | 5,0 | 350-650 | 4 leveles állapottól (BBCH 14) végleges fejméret vagy végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49) |
| póré-, gyöngy-, sarjadékhagyma | lisztharmat | 4 | 10 | 5,0 | 350-650 | 4 leveles állapottól (BBCH 14) szárnövekedés végéig (BBCH 49) |
| brokkoli, kelkáposzta, bimbóskel, karfiol | lisztharmat | 4 | 10 | 5,0 | 300-600 | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökernövekedés végéig (BBCH 49) |
| fejes saláta, endívia saláta, cikória, spenót, sóska, mángold | lisztharmat | 3 | 10 | 5,0 | 300-800 | 4 leveles állapottól (BBCH 14) virágzásig (BBCH 60) |
| karalábé | lisztharmat | 4 | 10 | 5,0 | 300-800 | 4 leveles állapottól (BBCH 14) 50%-os szárvastagságig (BBCH 45) |
| pasztinák, gumós zeller, torma, retek, cékla | lisztharmat | 2 | 10 | 5,0 | 350-1200 | nincs korlátozás |
| gyógynövények (kamilla, máriatövis, orbáncfű, cickafark, gyűszűvirág, orvosi csucsor, körömvirág, vasfű, macskagyökér, levendula) fűszernövények (metélőhagyma, metélőpetrezselyem, kapor, levélzeller, angelika, lestyán, szurokfű, borsikafű, tárkony, zsálya, izzóp, kakukkfű, citromfű, rozmaring, koriander, bazsalikom, menta, majoranna, zamatos turbolya) | lisztharmat | 3 | 10 | 2,5-5,0 | 300-800 | 4 leveles állapottól (BBCH 14) virágzásig (BBCH 60) |
| spárga, rebarbara | lisztharmat | 6 | 7 | 2,5-5,0 | 300-800 | 4 leveles állapottól (BBCH 14) 50%-os szárvastagságig (BBCH 45) |
| közterületi díszfák és díszcserjék | lisztharmat | 14 | 7 | 2,5-5,0 | 350-1200 | nincs korlátozás |

Házi-kerti felhasználás dózisa: 30-80 gramm készítmény/10 l víz.

Nettó tartalom: **25 kg**

Agrometry