

# ALOY Mg+S

GYORSAN FELVEHETŐ, ILLETVE TARTAMHATÁST BIZTOSÍTÓ,  
MAGNÉZIUM- ÉS KÉNTARTALMÚ FOLYÉKONY LEVÉLTRÁGYA SZUSZPENZIÓ

## GYÁRTJA:



**SAFAPAC LTD.**  
4 Stapledon Road, Orton Southgate,  
Peterborough, PE2 6TB., Egyesült Királyság  
Statistikai számjel: GB 676 996 353

## ENGEDÉLYTULAJDONOS:



**SAFAGROW LTD.**  
1 Stapledon Road, Orton Southgate,  
Peterborough, PE2 6TB., Egyesült Királyság  
Statistikai számjel: GB 101 946 830

## FORGALMAZZA:

**AGROMETRY KFT.**  
2000 Szentendre, Kisfórrás u. 30.  
Tel.: +36 20 910-9503, +36 20 365-6915  
E-mail: info@agrometry.hu

**GYERMEKEK ELŐL EL KELL ZÁRNI!  
FELHASZNÁLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA EL  
A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A CIMKEN!  
HASZNÁLAT ELŐTT ALAPOSAN FELRÁZANDÓ!**

**Tűz- és robbanásveszélyességi besorolás:** nem jelölésköteles.  
**Munkaegészségügyi várakozási idő:** 0 nap.

**ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ELJÁRÁS:** Mérgezés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

**KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK:** Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki. A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjaitól számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.



**Figyelem**

**Összetétele:** 24,1% (m/m) magnézium (MgO) (365 g/l)  
41,27% (m/m) kén (SO<sub>2</sub>) (625 g/l)

**Forgalomba hozatali engedély száma:** 04.2/1664-2/2018 NÉBIH

**Engedély érvényessége:** 2028. szeptember 24.

**Gyártási idő (nap, hó, év) és gyártási szám:** A csomagolóburkolaton található.

**Vámtarifaszám:** 310590

**Eltarthatóság:** Eredeti, zárt csomagolásban, közvetlen napsugárzástól védve, fagymentes helyen, 5 és 35 °C között minőségét minimum 2 évig megőrzi. Nem megfelelő tárolási körülmények között a termék enyhé besűrűsödése előfordulhat.

**FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁSOK:** Használat előtt mindig olvassa el a címkét!

**Használat előtt alaposan fel kell rázni!** Félig töltsük föl a permetező-tartályt vízzel, folyamatos kevertetés mellett adjuk hozzá a kívánt mennyiségű készítményt (Aloy Mg+S terméket). Várjuk meg, míg a készítmény teljesen feloldódik és csak ezt követően öntsük fel a tartályt vízzel, a kívánt mértékig. Amíg a permetezőszert a tartályban van (kijuttatásig és a kijuttatás alatt), a tartály kiürüléséig a keverőnek folyamatosan működnie kell.

**KEVERHETŐSÉG:** A készítmény számos növényvédő szerrel és termésvédő anyaggal keverhető, bár nem mindegyikkel. Tankkeverékként történő alkalmazás előtt minden esetben keverési próba elvégzése javasolt! A tankkeveréket a felhasználó saját felelősségére készíti és használja fel. Az ebből eredő bármilyen kárért, vagy veszteségért a gyártó és forgalmazó felelősséget nem vállal.

**HULLADÉKKEZELÉS:** Kerülni kell a tömény készítmény vízfolyásba jutását. A kiürült csomagolóanyagot háromszor ki kell öblíteni és a mosófolyadékot a permetlé-tartályba tölteni. Az üres és gondosan kiöblített kannát, valamint az egyéb csomagolóanyagokat veszélyes hulladékként kell kezelni, elszállíttatni és megsemmisíteni.

**H315** Bőrirritáló hatású.

**P264** A használatot követően alaposan kezelt kell mosni.

**P280** Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező.

**P302+P352** HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.

**P321** Szakellátás (lásd a címkén).

**P332+P313** Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.

**P362+P364** A szennyezett ruhát el kell vetni és az újabb használat előtt ki kell mosni.

**P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.



5

Nettó tartalom: **5 L**  
(=7,584 kg)

**Agrometry**

## FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

Kultúra	Dózis (l/ha)	Kijuttatási idő
Gabonafélék	2,0-4,0	Két leveles állapottól a virágzás fejlettségi állapotig. Hiánytünetek esetén 10-14 napos permetezési forduló betartásával ismételjük meg a kezelést. A zászlólevél kiterülésétől virágzásig (BBCH39-69) 2,0 l/ha-os dózis alkalmazása javasolt. <b>Vízmenyiség:</b> 200-250 l/ha.
Kukorica	2,0-4,0	4-6 leveles korban kezeljük. Hiánytünetek esetén 10-14 napos permetezési forduló betartásával ismételjük meg a kezelést. <b>Vízmenyiség:</b> 200-250 l/ha.
Káposztarepce	2,0-4,0	Egy kezelés esetén az a szármegnyulás kezdetén történjen. Az első kezelést 4-6 leveles korban, a másodikat szármegnyulás kezdetén végezzük el. Hiánytünetek esetén két kezelés javasolt, 10-14 napos permetezési forduló betartásával. Kerüljük a virágzás alatt történő kijuttatást. <b>Vízmenyiség:</b> 200-300 l/ha.
Napraforgó	2,0-4,0	A készítményt a lomb- és tányérvédelmet szolgáló gombaölőszeres kezelésekkel egy menetben, a 6-8 leveles, valamint a csillagbimbós állapotban juttassuk ki. Kerüljük a virágzás alatt történő kijuttatást. Hiánytünetek megjelenése esetén két kezelés elvégzése javasolt, 10-14 napos permetezési forduló tartásával. Kijuttatáskor javasolt <b>vízmenyiség:</b> 200-250 l/ha.
Alma, körte	4,0	Sziromhullás után kezeljük. Szükség esetén 10-14 nap múlva ismételjük meg a kezelést. Hiánytünet esetén virágzás előtt (rózsaszín bimbó) szintén kezeljük. <b>Vízmenyiség:</b> 500-1000 l/ha.
Cseresznye, meggy, szilva	4,0	Gyümölcskötődéskor kezeljük. Ha szükséges, 10-14 nap múlva ismételjük meg a kezelést. <b>Vízmenyiség:</b> 200-500 l/ha.
Szamóca	4,0	Zöldbimbós állapotban kezeljük, majd szükség esetén ismételjük 10-14 nap elteltével a kezelést. <b>Vízmenyiség:</b> 200-500 l/ha.
Málna	4,0	Virágzás kezdetén kezeljük. <b>Vízmenyiség:</b> 200-500 l/ha.
Burgonya	2,0-4,0	Egy héttel a teljes (100%-os) kelés után, ill. ha szükséges, gumónövekedés idején kezeljük. Hiánytünetek esetén 10-14 naponta kezeljük. <b>Vízmenyiség:</b> 200-300 l/ha.
Borsó, bab, sárgarépa, len	2,0-4,0	15 cm-es fejlettségnél kezeljük. Ha szükséges, ismételjük meg a kezelést 10-14 nap múlva. Sárgarépában az utolsó kezelés minimum 1 hónappal a tervezett betakarítás előtt kell történnjen. <b>Vízmenyiség:</b> 200-250 l/ha.
Cukorrépa	2,0-4,0	A készítményt a vegetáció alatt egy vagy két alkalommal, lombzáródáskor, illetve a lombvédelmi kezelésekkel együttesen juttassuk ki. Hiánytünetek megjelenésekor a kezeléseket 10-14 napos permetezési fordulóval végezzük el. A kijuttatáshoz javasolt <b>vízmenyiség:</b> 250-300 l/ha.
Brokkoli, bimbóskel, káposzta, karfiol, kelkáposzta, takarmányrépa, cékla, karórépa, fehérrépa (petrezselyemgyökér)	2,0-4,0	4-6 leveles korban kezeljük, hiánytünetek esetén 10-14 napos permetezési fordulóval ismételjük a kezelést. <b>Vízmenyiség:</b> 200-250 l/ha.