

BETASANA SC

GYOMIRTÓ PERMETEZŐSZER

A növényvédő szert gyártja és az engedély tulajdonosa:

UPL EUROPE LTD.,

The Centre, Birchwood Park, Warrington,
WA3 6YN, Egyesült Királyság
Tel: +44 1925 859016



Címkézésért felelős személy:

Dr. Imrei Zoltán, 1124 Budapest, Fodor u. 33.

Első magyarországi forgalmazó:

AGROMETRY KFT.

2000 Szentendre, Kisforrás u. 30.
Tel.: +36 20 910-9503, +36 20 365-6915
E-mail: info@agrometry.hu

Szerforma: vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)

Hatóanyag: 160 g/l (16,0 m/m%) fenmedifám

Forgalombahozatali engedély száma:

02.5/667/1/2009 MGSZHK

Forgalmazási kategória: I.

Gyártási idő (nap, hó, év) és gyártási szám:

A csomagolóburkolaton található.

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **2 év**.

**AZ EMBERI EGÉSZSÉG ÉS A KÖRNYEZET VESZÉLYEZTETÉSÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN BE KELL TARTANI A HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELŐÍRÁSAIT.
FELHASZNÁLÁS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY MEGÉRTETTE!**

EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉG, A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):

>2000 mg/ttkg

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelöléskötelese

Vízi szervezetekre való veszélyesség:

közepesen veszélyes

Méhvészélyesség: nem jelöléskötelese

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H319 Súlyos szemirritációt okoz

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.


P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladék-ként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Különleges S-mondatok

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!

SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.

SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **5 m** távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!



Figyelem

Nettó tartalom: **5 L**

Agrometry

EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható. A nem-célnövények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

Mérgezősokor vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ÖVÉRENDSZABÁLYOK

Egényi védőfelszerelés előkészítőknél és kijuttatóknál: növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg vagy arcvédő, védőlábbeli.

Elsősegélynyújtás: Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Mérgezősokor, allergias megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (ld. általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

VÁRAKOZÁSI IDŐK

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás (120 nap).

CSEBER Nonprofit Kft.

A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a <http://www.cseber.hu> címen.
Tel.: +36 1/340-4888



A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

A készítmény egy vegetációs időszakban legfeljebb 3 alkalommal használható fel!

A készítményt posztemergensen kell kijuttatni. A kezelés történhet egyszeri alkalommal vagy osztott kezelés formájában.

Egyszeri alkalmazás esetén a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles, a cukorrépa 2-6 leveles fenológiai stádiumában kell kijuttatni a készítményt 3,5-6,0 l/ha-os dózisban.

Osztott kezelés esetén az első kezelést a cukorrépa szikleveles - 2 leveles fejlettségétől, a magról kelő kétszikű gyomnövények szik - 2 valódi leveles állapotában kell elvégezni 1,5 l/ha dózissal, a második kezelést ezt követően 10-12 nap múlva 2,0 l/ha dózissal. Amennyiben a gyomosodás ezt szükségessé teszi a második kezelést követő 8-10 nap múlva kerülhet sor a harmadik kezelésre 2,5 l/ha szer felhasználásával.

A magról kelő kétszikű gyomfajok elleni spektrum szélesítésének céljából a szert klórindazon hatóanyagú készítmény engedélyezett dózisával célszerű tankkombinációban kijuttatni úgyszintén osztott kezeléseik formájában.

A készítmény egyszerű gyomnövények ellen nem hatékony, ezért ezek ellen preemergens alapkezelésben kell részesíteni a cukorrépat. Erős napsütésben, 25 °C fok feletti hőmérsékleten tilos kezelni a készítménnyel a cukorrépat, ilyenkor a permetezést a hűvösebb, esti órákban kell elvégezni. Növényi kórokozók, állati kártevők által legyengített, vagy egyéb más okból legyengült cukorrépat tilos a készítménnyel kezelni.

A fenmedifam hatóanyag a HRAC „C”, „fotoszintézisgátló herbicidek a PS-II rendszerben” herbicid-csoporton belül a bisz-fenil-karbamát hatóanyagcsoportba sorolható.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

GYÁRTÓI AJÁNLÁS

Más növényvédő szerrel történő kijuttatás előtt kevérségi próbát kell végezni.

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Kultúra	Károsító	A kezelések évenkénti maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap)	A kijuttatáshoz szükséges		Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
				szer mennyisége (l/ha)	víz mennyisége (l/ha)	
cukorrépa	magról kelő kétszikű gyomnövények	1	-	3,5-6,0	200-300	2 leveles állapotól 6 leveles állapotig (BBCH 12-16)
		3	8-12	osztott kezelés formájában: 1. kezelés: 1,5 l/ha 2. kezelés: 2,0 l/ha 3. kezelés: 2,5 l/ha		szikleveles fejlettségtől 6 leveles állapotig (BBCH 10-16)



9 80060
5 99887