

VIVENDI 200

GYOMIRTÓ PERMETEZŐSZER

A növényvédő szert gyártja és az engedély tulajdonosa:
UPL EUROPE LTD.,

The Centre, Birchwood Park, Warrington
Cheshire WA3 6YN, Egyesült Királyság



Címkezésért felelős személy:

Dr. Imrei Zoltán, 1124 Budapest, Fodor u. 33.

Első magyarországi forgalmazó:

AGROMETRY KFT.

2000 Szentendre, Kisfórrás u. 30.

Tel.: +36 20 910-9503, +36 20 365-6915

E-mail: info@agrometry.hu

Szerforma: folyékony vízoldható koncentrátum (SL)

Hatóanyag: 200 g/l (18,2 m/m%) klopivalid

Forgalombahozatali engedély száma:

04.2/5023-1/2016. NÉBIH

Forgalmazási kategória: I.

Gyártási idő (nap, hó, év) és gyártási szám:

A csomagolóburkolaton található.

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **2 év**.

**AZ EMBERI EGÉSZSÉG ÉS A KÖRNYEZET VESZÉLYEZTETÉSÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN BE KELL TARTANI A HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELŐÍRÁSAIT.
FELHASZNÁLÁS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY MEGÉRTETTE!**

EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉG, A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon): >2000 mg/ttkg

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tartsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!

Spe 1 A talajvíz védelme érdekében ezt, vagy klopivalidot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen az előírtnál nagyobb mennyiségben, illetve többször!

Spe 2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területeken ne használja!

Spe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **5 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyep) biztonsági övezetet!

A nem cél növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettel **5 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK:

Az előírt kockázatcsökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.



Nettó tartalom: **5 L**

Agrometry

Mérgezőskor vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ÖVÉRENDSZABÁLYOK

egyéni védőfelszerelés előkészítőknak: védőkesztyű
kijuttatóknak: nem szükséges

Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás: Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. **Szembejutás** esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vizet itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antitóduma nincs

VÁRAKOZÁSI IDŐK

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 (száradásig)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

cukorrépa: 42 nap, **őszi búza, őszi és tavaszi árpa, zab, őszi káposzta-repce:** előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

CSEBER Nonprofit Közhasznú Kft.

növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a <http://www.cseber.hu> címen. Tel.: +36 1/340-4888



CSEBER
CSOMAGOLÓANYAG-EGYÜJTŐHELYEK LISTÁJA

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI SZAKASZOK

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal juttatható ki!
Cukorrépában elsősorban mezei acattal (*Cirsium arvense*), parlagfűvel (*Ambrosia artemisiifolia*), sertiótióvis fajokkal, keserűfű fajokkal, napraforgó árvakeléssel fertőzött területek gyomirtására javasolható. A készítményt a cukorrépa 4-6 leveles állapotában kell kijuttatni 0,6-0,9 l/ha dózisban, a magról kelő kétszikű gyomnövények, vidrakeserűfű (*Polygonum amphibium*) 2-4 valódi leveles, a mezei acat tölevélrózsás állapotában a legérzékenyebb a készítményre.

Kalászosokban (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, zab) a készítményt a kultúrnövény 3 leveles korától a szárbá indulás kezdetéig lehet kijuttatni 0,375-0,6 l/ha dózisban. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles, a mezei acat tölevélrózsás állapotában. Kalászosokban elsősorban 2,4-D, MCPA, fluroxipir hatóanyagú készítményekkel kombinációban javasolt felhasználni, ez esetben mindig figyelembe kell venni a kombinációs partner engedélykírat szerinti kijuttatási paramétereit.

Őszi káposztarepceben a 4 leveles állapottól a virágbimbók megjelenéséig juttatható ki a készítmény 0,375-0,6 l/ha dózisban.

Utóvetemény: A készítménnyel kezelt kultúrnövény növényi maradványai károsíthatják az alábbi klopíralid hatóanyagra érzékeny kultúrákat: borsó, bab, csillagfűrt és más hüvelyesek, sárgarépa, petrezselyem, pasztinák és más emyős virágzatú kultúrák, burgonya, saláta és egyéb fészkes virágzatú kultúrnövények.

Nem vethetők a fentebb felsorolt érzékeny kultúrák a készítmény kijuttatásával azonos évben, továbbá a kezelést követő tavasszal, amennyiben az előző évben júliusnál később került alkalmazásra a készítmény!

A betakarítás után a lehető leghamarabb fel kell aprítani és be kell dolgozni a talajba a növényi maradványokat, hogy azok hamarabb lebomoljanak. Érzékeny növények vetése előtt meg kell győződni arról, hogy a kezelt kultúrnövény maradványai teljesen lebomlottak.

A készítménnyel kezelt kalászos kultúra növényi maradványainak bedolgozása után ugyanabban az évben csak ellenálló kultúrák (pl. kalászos) vethetők. A klopíralid hatóanyag a HRAC „0”, hormonhatású herbicidek herbicidcsoporton belül a piridiloxil-alkán-karbonsavak hatóanyagcsoportba sorolható.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Kultúra	Károsító	A kijuttatáshoz szükséges		Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
		szer mennyisége (l/ha)	víz mennyisége (l/ha)	
cukorrépa	magról kelő kétszikű gyomnövények, mezei acat, napraforgó árvakelés, vidrakeserűfű	0,6-0,9	250-300	4-6 leveles állapot (BBCH 14-16)
őszi búza, őszi és tavaszi árpa, zab	magról kelő kétszikű gyomnövények, mezei acat, napraforgó árvakelés	0,375-0,6	250-300	3 leveles kortól a szárbá indulás kezdetéig (BBCH 13-30)
őszi káposzta-repce	magról kelő kétszikű gyomnövények, mezei acat, napraforgó árvakelés	0,375-0,6		4 leveles állapottól a virágbimbók megjelenéséig (BBCH 14-51)