

AFITOX 50 WG

ROVARÖLŐ SZER



Az Afitox 50 WG készítmény azonos a 35756/2001. FVM engedélyszámú **Pirimor 50 WG** referenciatermékkel.

REFERENCIA SZER ENGEDÉLYTULAJDONOSA:
ADAMA HUNGARY ZRT. (Magyarország)

GYÁRTÓJA:
SYNGENTA CROP PROTECTION AG (Svájc)

**PÁRHUZAMOS BEHOZATALI ENGEDÉLYTULAJ-
DONOS / IMPORTŐR, FORGALMAZÓ:**
AGROMETRY KFT.

2000 Szentendre, Kisfóráss u. 30.
Tel: +3620-910-9503; +3620-365-6915
e-mail: info@agrometry.hu web: www.agrometry.hu
Származási ország: Horvátország

Szerforma: vízben diszpergálható granulátum (WG)

Hatóanyag: 500 g/kg (50 %m/m) pirimikarb

UFI: HP7K-3T04-Q20M-7WQA

Párhuzamos behozatali engedély száma: 6300/1820-2/2022.
NÉBIH

Forgalmazási kategória: II.

Gyártási idő (nap/hó/év) és gyártási szám:

A csomagolóburkolaton található.

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **3 év**.

**AZ EMBERI EGÉSZSÉG ÉS A KÖRNYEZET VESZÉLYEZTETÉSÉNEK ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN BE KELL TARTANI A HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELŐÍRÁSAIT.
FELHASZNÁLÁS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS
GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY MEGÉRTETTE!**



Nettó tartalom: **1 KG**

Agrometry

EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉG, A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon): 87 mg/ttkg.
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes.
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

- H301** Lenyelve mérgező.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H332 Belélegezve ártalmas.
H351 Feltehetően rákot okoz.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P261 Kerülje a porpermet belélegzését.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280 Védőkesztyű/védőruha használata kötelező.
P301+P310 LENYELES ESETÉN: azonnal forduljon orvoshoz.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt a friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308 + P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: forduljon orvoshoz.
P405 Elzárva tartandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH208 Pirimikarbot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Különleges S-mondatok:

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!
A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **40 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyepek) biztonsági övezetet!

EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

VESZÉLY



A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Kultúra	Károsító	A kezelések évenkénti maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap)	Dózis (kg/ha)	Permetlé (l/ha)	Az utolsó kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint)
őszibarack	levéltetű	2	14	0,8	500-1000	érés kezdetéig (BBCH 81)
almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)		2	14	0,35-0,5	500-1000	érés kezdetéig (BBCH 81)
uborka		2	14	0,35-0,5	200-400	érésig (BBCH 85)
paprika, paradicsom		1	-	0,35-0,5	200-400	érésig (BBCH 85)
fejes káposzta (fehér és vörös), kelbimbó, saláta		1	-	0,35-0,5	200-400	50 %-os fejméret (BBCH 45)
kelkáposzta, kínai kel		2	14	0,4	200-400	50 %-os fejméret (BBCH 45)
kalászosok (őszi búza, árpa, rozs, zab, tritikále)		2	14	0,25-0,3	300-500	virágzás vége (BBCH 69)
cukorrépa		2	14	0,25-0,3	300-500	gyökérfejlődés vége (BBCH 49)
napraforgó		2	14	0,25-0,3	300-500	zöldérés (BBCH 81)
dohány		2	14	0,25-0,3	300-500	az első szedés előtt 3 héttel (BBCH 83)
mák		2	14	0,5	300-500	zöldtok állapot (BBCH 79)

Mérgezőskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199



CSEBER Nonprofit Kft.

növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a <http://www.cseber.hu> címen.

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ÓVÓRENDSZABÁLYOK

Egyéni védőfelszerelés:

Előkészítőknek: védőruha, védőkesztyű, szemvédő/arcvédő, FFA1P2SL szelepes szűrő félálarc, vagy A1P2 szűrőbetéttel felszerelt légzésvédő félálarc.

Kijuttatóknak: védőruha, védőkesztyű, szemvédő/arcvédő, FFA1P2SL szelepes szűrő félálarc, vagy A1P2 szűrőbetéttel felszerelt légzésvédő félálarc (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Elsősegélynyújtás:

Mérgezőskor, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (lásd: inszekticid karbamát mérgezés) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. *Bőrrel való érintkezés* esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. *Szembe jutás esetén* a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés esetén*, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. *TILOS hánytatni!*

Terápia: inszekticid karbamát mérgezés.

Ellenanyag: Atropin.

VÁRAKOZÁSI IDŐK:

Munkaegészségügyi várakozási idő: 3 nap

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kalászosok (őszi búza, árpa, rozs, zab, tritikále) – 35 nap; **nappaforgó** – 28 nap; **dohány, mák** – 21 nap; **saláta** – 14 nap; **almatermésűek** (alma, körte, birs, naspolya) – 10 nap; **cukorrépa, káposztafélék** (fejes káposzta/fehér, vörös, kelbimbó, kelkáposzta, kínai kel), **ősziarack** – 7 nap; **paprika, paradicsom, uborka** – 3 nap

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

A védekezést előrejelzésre kell alapozni és a kezeléseket a kártevők megjelenésekor kell megkezdeni. Elhúzódó betelepedés, illetve felszaporodás esetén szükséges a kezelés megismétlése.

Almatermésűekben és ősziarackban a levéltetű ősnyák utódnemzedékei ellen, a kolóniák kialakulása előtt kell védekezni, a gazdacserés levéltetű fajok esetében a nyári szűznemzessel szaporodó nemzedékek ellen is védekezni kell.

Szántóföldi kultúrákban az állománykezelést növényvizsgálatra alapozott vagy sárgatálás megfigyelés alapján, az első egyed betelepülését követően ajánlott elkezdni.

Zöldségfélékben is sárgatálás előrejelzés alapján a kártevők megjelenésekor kell megkezdeni a kezeléseket, az utódnemzedékek ellen pedig szükség esetén meg kell ismételni azt.

Káposztafélékben és mákban a permetléhez nedvesítőszert hozzáadása javasolt. Mákban erős levéltetű fertőzés esetén célszerű egy másik engedélyezett rovarölő szerrel kombinációban kijuttatni.

Házi kerti felhasználás: 0,1 %-os (10 g szer / 10 liter víz) koncentrációban.

A pirimikarb IRAC „1A” besorolása, a zoocid karbamátok közé tartozó acetilkolin-észteráz gátló, kontakthatású idegméreg.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

AFITOX 50 WG

ROVARÖLŐ SZER



Az Afitox 50 WG készítmény azonos a 35756/2001. FVM engedélyszámú **Pirimor 50 WG** referenciatermékkel.

REFERENCIA SZER ENGEDÉLYTULAJDONOSA:
ADAMA HUNGARY ZRT. (Magyarország)

GYÁRTÓJA:
SYNGENTA CROP PROTECTION AG (Svájc)

**PÁRHUZAMOS BEHOZATALI ENGEDÉLYTULAJ-
DONOS / IMPORTŐR, FORGALMAZÓ:**
AGROMETRY KFT.

2000 Szentendre, Kisfórrás u. 30.
Tel: +3620-910-9503; +3620-365-6915
e-mail: info@agrometry.hu web: www.agrometry.hu
Származási ország: Horvátország

Szerforma: vízben diszpergálható granulátum (WG)

Hatóanyag: 500 g/kg (50 %m/m) pirimikarb

UFI: HP7K-3T04-Q20M-7WQA

Párhuzamos behozatali engedély száma: 6300/1820-2/2022.
NÉBIH

Forgalmazási kategória: II.

Gyártási idő (nap/hó/év) és gyártási szám:

A csomagolóburkolaton található.

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **3 év.**

**AZ EMBERI EGÉSZSÉG ÉS A KÖRNYEZET VESZÉLYEZTETÉSÉNEK ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN BE KELL TARTANI A HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELŐÍRÁSAIT.
FELHASZNÁLÁS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS
GYŐZDJÖN MEG ARRÓL, HOGY MEGÉRTETTE!**



Nettó tartalom: **1 KG**

Agrometry