Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növényvédelmi Igazgatóság
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
Levelezési cím: 1525 Budapest Pf. 30.
Telefon: +36 (30) 216-6303
ni@nebih.gov.hu
portal.nebih.gov.hu

Ikt. sz.: **8750/71155-2/2026**
Tárgy: **Neoram 37,5 WG gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása
Ügyintéző: Csató Barbara
Elérhetőségek: ni@nebih.gov.hu
Oldalak száma: 3
Mellékletek: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat
Hiv. szám: -

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a **Gowan Crop Protection Ltd.** (Rothamsted Research, West Common, Harpenden, Hertfordshire, AL5 2JQ, Anglia) ügyfél kérelmére a **Neoram 37,5 WG gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

Az engedélyező hatóság a **Neoram 37,5 WG gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló *6700/516-1/2023. NÉBIH* számú határozatát – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint

m ó d o s í t j a:

I. Az engedélyokirat 1.3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

1.3. Engedélyokirat érvényessége: **2030. június 30.**

II. Az engedélyokirat 7. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

7. A növényvédő szer eltarthatósága:

Fizikai-kémiai tulajdonságait **eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban** legalább két évig megőrzi.
Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő **2** év.

A határozat véglegessé válását követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. A megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Az eljárás díja 25.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

Szűcs Csaba [sk]
2026.10.13. 15:36:47

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a http://anyk.nebih.gov.hu weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

Az ügyfél a 2026. augusztus 3. napján kelt kérelmében a **Neoram 37,5 WG gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének meghosszabbítását kérte az engedélyező hatóságtól.

Az engedélyező hatóság a **Neoram 37,5 WG gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyében a „7. A növényvédő szer eltarthatósága” pontját hivatalból módosította.

Az engedélyező hatóság a kérelmet megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelem benyújtása megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A növényvédő szerek engedélyezésének közösségi szabályairól a *növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117 EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 1107/2009/EK rendelet (*a továbbiakban: *EK Rendelet)* rendelkezik.

Az engedélyező hatóság *az EK Rendelet 45. cikkelye* alapján, illetve *a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V.15.) FVM rendelet* (a továbbiakban*: R.*) egyes, az eljárásokra vonatkozó részletszabályai alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Jelen eljárás díja az *egyes agrártárgyú hatósági eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének szabályairól szóló 52/2025. (XII. 19.) AM rendelet* 1. melléklet 8.9.1.3. pontja alapján került megállapításra.

Az engedélyező hatóság határozatát a *Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012 (II.29.) Korm. rendelet 3. § (1)* bekezdésében, és *a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.12.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének d) pontjában és a (2) bekezdésének a) pontjában* biztosított jogkörében eljárva, az *általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1)* megfelelően hozta.

A jogorvoslat lehetősége az *Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 12. § (1) bekezdése, 13. § (1)-(3) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 39. § (1) bekezdése és 77. § (1)-(2) bekezdése,* továbbá *a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §,* valamint *az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont d) alpontja, 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és b) pontja* alapján biztosított.

Budapest, 2026. október 13.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

P.H.

Kapja:
1. Ügyfél a meghatalmazott útján értesül
2. Irattár

(611/2026)

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növényvédelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
☎ +36 (30) 216-6303
E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu
portal.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

1.1. Engedélyokirat száma:	**6700/516-1/2023 NÉBIH**
1.2. Növényvédő szer neve:	**Neoram 37,5 WG**
1.3. Engedélyokirat érvényessége:	**2030. június 30.**
1.4. Engedélyokirat tulajdonosa:	**Gowan Crop Protection Ltd.** Rothamsted Research, West Common, Harpenden, Hertfordshire, AL5 2JQ Anglia
1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:	-

2. A növényvédő szer adatai:

2.1. Növényvédő szer gyártója:	Gowan Crop Protection Ltd. (Anglia)
2.2. Növényvédő szer rendeltetése:	gombaölő szer
2.3. Növényvédő szer formulációja:	vizes diszpergálható granulátum **(WG)**
***2.4. Növényvédő szer összetétele**:*	
2.4.1. Hatóanyag 1.	
ISO név	**réz-oxiklorid**
CAS szám	*1332-40-7*
IUPAC név	*diréz-klorid-trihidroxid*
tiszta hatóanyag részaránya	375 g/kg

3. Minőségi követelmények:

3.1. Hatóanyag tartalom	
3.1.1. réz-oxiklorid (HPLC-UV)	30,24 ± 1,5 % (m/m)
3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:	Meg kell felelnie a WG formuláció FAO követelményeinek.
Tájékoztató jellegű adatok:	**Megjelenés:** világos zöld színű, szagtalan granulátum **Térfogatsűrűség:** 1,24 g/cm^3 **pH (1%-os hígítás**): 7,76

Nedvesíthetőség (100 ml): 5 g
Nedves szita maradék (75 µm): 0,03%
Tartós habképződés (1%-os hígítás, 1 perc): 17 ml

4. Felhasználásra vonatkozó előírások:

Kultúra	**Károsító**	**A kezelések évenkénti maximális száma**	**Két kezelés közt eltelt minimális időtartam** *(nap)*	**A kijuttatáshoz szükséges**		**A kezelés ideje** (*fenológiai állapot szerint)*
				készítmény *(kg/ha)*	**víz** *(l/ha)*	
alma, körte, birs, naspolya	baktériumos és gombás ágelhalás, ervíniás elhalás (tűzelhalás)	2	7	3,0-4,0	800-1500	betakarítás utáni állapottól (BBCH 90) levélrügy duzzadás végéig (BBCH 03)
	varasodás	4		2,0-2,5	600-1500	levélrügy duzzadás kezdetétől (BBCH 01) egérfüles állapotig (BBCH 54)
		6		1,25	600-1500	5-10 mm-es gyümölcskezdemények kialakulásától (BBCH 71) fajtára jellemző szín kialakulásáig (BBCH 85)
cseresznye, meggy, kajszi, szilva, mandula	baktériumos és gombás ágelhalás, levéllyukacsosodás (sztigminás betegség), apiognomóniás levélfoltosság, tafrinás levélfodrosodás, moníliás betegség	4	14	2,0-2,5	600-1500	betakarítás utáni állapottól (BBCH 90) fehér/pirosbimbós állapotig (BBCH 58)
őszibarack, nektarin	baktériumos és gombás ágelhalás, levéllyukacsosodás (sztigminás betegség), apiognomóniás levélfoltosság, tafrinás levélfodrosodás, moníliás betegség	4	7	2,0-2,5	600-1500	betakarítás utáni állapottól (BBCH 90) pirosbimbós állapotig (BBCH 58)
szőlő *bor és csemege*	peronoszpóra, orbánc	4	7	2,0-2,5	600-1000	bogyófejlődés kezdetétől (BBCH 70) zsendülésig (BBCH 85)

paprika *szabadföldi*	baktériumos betegségek	3	7	1,5-2,0	400-800	két leveles állapottól (BBCH 12) teljes érésig (BBCH 89)
paradicsom *szabadföldi*	baktériumos betegségek, fitoftórás betegség (paradicsomvész)	4	7	2,0-2,5	400-800	két leveles állapottól (BBCH 12) teljes érésig (BBCH 89)
burgonya	baktériumos betegségek, fitoftórás betegség (burgonyavész)	4	7	2,0-2,5	400-800	két leveles állapottól (BBCH 12) teljes érésig (BBCH 89)
görögdinnye, sárgadinnye, uborka, cukkíni, spárgatök, patisszon *szabadföldi*	peronoszpóra, fenésedés (antraknózis), pszeudomonászos betegség	4	7	1,5-1,8	400-800	két leveles állapottól (BBCH 12) teljes érésig (BBCH 89)
Kiskultúrás felhasználások (1107/2009 EK rendelet 51-es cikk szerint) A felhasználások nincsenek alátámasztva EPPO IV zónás biológiai hatékonysági és növény szelektivitási vizsgálatokkal						
dió, mogyoró, gesztenye	baktériumos és gombás eredetű betegségek	4	7	2,0-2,5	600-1500	betakarítás utáni állapottól (BBCH 90) levélkezdemények megjelenésig (BBCH 15)
fokhagyma, póréhagyma, gyöngyhagyma, sarjadékhagyma	baktériumos betegségek, peronoszpóra	4	7	2,0-2,5	400-800	négy leveles állapottól (BBCH 12) végleges fejátmérő eléréséig (BBCH 49)
konyhakömény, édeskömény	peronoszpóra	3	7	2,0-2,5	400-800	két leveles állapottól (BBCH 12) teljes érésig (BBCH 89)
orvosi csucsor	fitoftórás betegség	3	7	2,0-2,5	400-800	két leveles állapottól (BBCH 12) teljes érésig (BBCH 89)

Házikerti dózis:

- zöldségfélékben és burgonyában: 25-45 ml/4-6 liter víz/100 m^2
- gyümölcsfélékben: 25-90 ml/8-12 liter/100 m^2

<u>Előírt növényvédelmi technológia:</u>

Az évente hektáronként kijuttatott fémréz mennyisége nem haladhatja meg a 4000 g-ot!

Virágzó kultúrákban, vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve, ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.

Almatermésűekben (alma, körte, birs, naspolya) a *baktériumos és gombás ágelhalások*, illetve az *ervíniás elhalás (tűzelhalás)* ellen megelőző jelleggel a betakarítást követően a levélrügy duzzadás kezdetéig lehet kijuttatni. Lemosó permetezésnél ügyelni kell arra, hogy a permetlé az ágakat, gallyakat, rügyeket, rügyalapokat is teljes mértékben, egyenletesen fedje.
A *varasodás* elleni kezeléseket szintén megelőző jelleggel, előrejelzésre alapozva, a virágzás előtt szükséges elkezdeni. A virágzás időszaka után, a réz érzékeny fajoknál, illetve fajtáknál, a védekezést a viaszosodást követően célszerű folytatni.

Csonthéjasokban (cseresznye, meggy, kajszi, őszibarack, nektarin, szilva) és **mandulában** a készítményt a *baktériumos és gombás ágelhalások,* illetve *a levélbetegségek* ellen megelőző jelleggel szükséges kijuttatni. Lemosó permetezésnél ügyelni kell arra, hogy a permetlé az ágakat, gallyakat, rügyeket, rügyalapokat is teljes mértékben, egyenletesen fedje. A védekezés tervezésekor figyelembe kell venni az adott faj, illetve fajta réz érzékenységét.

Szőlőben (bor és csemege) a *peronoszpóra* és az *orbánc* elleni védekezést megelőző jelleggel, előrejelzésre alapozva, az első tünetek megjelenése előtt szükséges elkezdeni.

Szabadföldi zöldségfélékben (paprika, paradicsom, görögdinnye, sárgadinnye, uborka, cukkíni, spárgatök, patisszon) a *baktériumos és gombás betegségek* elleni védekezést megelőző jelleggel, előrejelzésre alapozva, a kezdeti tünetek kialakulása előtt szükséges elkezdeni.

Burgonyában a készítmény *baktériumos betegségek és a fitoftórás betegség (burgonyavész)* elleni kijuttatását megelőző jelleggel, előrejelzésre alapozva, a kezdeti tünetek megjelenése előtt szükséges elkezdeni.

Héjasokban (dió, mogyoró, gesztenye) készítményt a *baktériumos és gombás betegségek* ellen megelőző jelleggel szükséges kijuttatni. Lemosó permetezésnél ügyelni kell arra, hogy a permetlé az ágakat, gallyakat, rügyeket, rügyalapokat is teljes mértékben, egyenletesen fedje. A védekezés tervezésekor figyelembe kell venni az adott faj, illetve fajta réz érzékenységét.

Fokhagyma, póréhagyma, gyöngyhagyma és **sarjadékhagyma** kultúrákban a készítményt a *baktériumos betegségek* és *peronoszpóra* ellen előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, az első tünetek megjelenése előtt szükséges kijuttatni.

Gyógy- és fűszernövény (édeskömény, konyhakömény, orvosi csucsor) kultúrákban a *peronoszpóra* és a *fitoftórás betegség* elleni védekezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, az első tünetek megjelenése előtt szükséges elkezdeni.

A felhasznált vízmennyiséget a lombozat nagyságához, illetve a permetezőgép típusához kell igazítani. Mindig törekedni kell az egyenletes permetlé fedettségre, még a lombozat belsejében is.

Hatásmechanizmus:
*A **réz** több hatáshelyű, kontakt hatóanyag (FRAC kód: M 01)*

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:


5.1. Veszélyességi besorolás:

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD_{50} értéke (patkányon):	**>2000 mg/ttkg**
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	**kifejezetten veszélyes**
Méhveszélyesség:	mérsékelten kockázatos
Méhveszélyesség toxicitás alapján:*	*mérsékelten veszélyes*
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján:*	*mérsékelten kockázatos*
Tűzveszélyességi besorolás:	**nem jelölésköteles**

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram:



Figyelmeztetés: Figyelem

Figyelmeztető mondatok/H-mondatok:

H332	Belélegezve ártalmas.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok/P-mondatok:

P261	Kerülje a por belélegzését.
P280	Védőkesztyű használata kötelező.
P304+P340	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P312	Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH401	Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

* Címkén nem feltüntetendő adat

5.2. Különleges S-mondatok:

SP 1	A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
SPe 1	A talaj élő szervezeteinek védelme érdekében ezt, vagy rezet tartalmazó egyéb készítményt ne használja ugyanazon a területen 4,0 kg fémréz/ha/év összegzett dózist meghaladó mennyiségben!
SPe 3	A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **50 m (**90%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén **20 m)** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet, melyből legalább **20 m** növényzettel borított (zárt gyep)!
SPe 8	Méhekre veszélyes! Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmat jelenléte esetén méhkímélő technológiában alkalmazható!

*5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások***:**

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

A vízi szervezetek védelme érdekében a növényvédő szer használata lejtős területeken (≥ 3 ° lejtőmeredekség) nem javasolt.

5.4. Várakozási idők

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő:

Kultúra	**Munkaegészségügyi várakozási idő** (nap)
almatermésűek *(alma, körte, birs, naspolya) BBCH 90 és BBCH 03 között*	9
almatermésűek *(alma, körte, birs, naspolya) BBCH 01 és BBCH 54 között*	6
almatermésűek *(alma, körte, birs, naspolya) BBCH 71*	0 (száradásig)
cseresznye, meggy, kajszi, szilva, mandula	3
őszibarack, nektarin, dió, mogyoró, gesztenye	6
szőlő	22
paprika, paradicsom, burgonya, görögdinnye, sárgadinnye, uborka, cukkíni, spárgatök, patisszon, fokhagyma, póréhagyma, gyöngyhagyma, sarjadékhagyma, konyhakömény, édeskömény, orvosi csucsor	0 (száradásig)

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Kultúra	**Várakozási idő** (nap)
almatermésűek <BBCH 71 *(alma, körte, birs, naspolya)*	Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
almatermésűek >BBCH 71 *(alma, körte, birs, naspolya)*	21
csonthéjasok *(cseresznye, meggy, kajszi, szilva, mandula, őszibarack, nektarin)*	Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
szőlő	21
burgonya, paradicsom	14
paprika, görögdinnye, sárgadinnye, uborka, cukkíni, spárgatök, patisszon	7
dió, mogyoró, gesztenye	21
fokhagyma, póréhagyma, gyöngyhagyma, sarjadékhagyma	14
konyhakömény, édeskömény	14
orvosi csucsor	14

5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.5.1. Egyéni védőfelszerelés

5.5.1.1. Előkészítőknek: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő)

5.5.1.2. Kijuttatóknak: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő) (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

5.5.1.3. Mezőgazdasági dolgozóknak: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő)

5.5.2. Elsősegélynyújtás:

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (ld: rézmérgezés kezelése) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. *Szembe jutás* esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés* esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, orvosi ellátást biztosítani**. TILOS ricinus, tej és zsíros ételek fogyasztása!** Toxikus mennyiség szervezetbe jutása esetén elsősegélynyújtásként tojásfehérje itatható a beteggel, mely megköti a rezet réz-albuminát formájában, azonban fontos, hogy ezt a későbbiekben mindenképpen el kell távolítani a gyomorból!

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés
Ellenanyag: javasolt kelátképzők a D-penicillamin, a dimercaprol (BAL), a $CaNa_2$-EDTA, DMPS valamint penicillamin intolerancia fennállása esetén a trientin hatóanyagú gyógyszerek (pl.Cuprior)

6. Kiszerelés, csomagolás:

6.1. A kiszerelés térfogata/tömege:	0,25 kg	1 kg; 5 kg; 10 kg
6.2. A csomagolószer anyaga:	alumínium tasak papírdobozban	papírzsák

7. A növényvédő szer eltarthatósága:

Fizikai-kémiai tulajdonságait **eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban** legalább két évig megőrzi.
Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő **2** év.

8. Forgalmazási kategória:

5 kg; 10 kg: **I.**
0,25 kg; 1 kg: **II.**

Budapest, 2026. október 13.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

P.H.